

Potok Pozděchůvka

L.VS.17



| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Localisation: | 49.232457N 17.957903E |
| Area: | 37.636 ha |
| Category: | Wetlands of local importance |
| Wetland's type: | 2 |
| The degree of protection: | NM |
| Reason protection: | KE |
| Altitude: | 387 - 650 m |

Natural habitats

| Habitat code | Habitat name | Code of the habitat type | Name the habitat type | Area | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
|--------------|--|--------------------------|--|----------|-------------------|-----------------------|
| K3 | Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny | -- | -- | 0.213 ha | 0.57 | 2 |
| L2.2 | Údolní jasanovo-olšové luhy | 91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>) | 0.692 ha | 1.84 | 3.65 |
| L2.2B | Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty | -- | -- | 1.864 ha | 4.95 | 2.3 |
| L3.3B | Typické karpatské dubohabřiny | 9170 | Dubohabřiny asociace <i>Galio-Carpinetum</i> | 0.875 ha | 2.33 | 2.04 |
| L5.1 | Květnaté bučiny | 9130 | Bučiny asociace <i>Asperulo-Fagetum</i> | 1.067 ha | 2.84 | 3.99 |
| T1.1 | Mezofilní ovsíkové louky | 6510 | Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (<i>Arrhenatherion</i> , <i>Brachypodio-Centaureion nemoralis</i>) | 5.088 ha | 13.52 | 2.34 |
| T1.3 | Poháňkové pastviny | -- | -- | 0.052 ha | 0.14 | 2 |
| T1.5 | Vlhké pcháčové louky | -- | -- | 0.103 ha | 0.27 | 2 |
| T1.6 | Vlhká tužebníková lada | 6430 | Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně | 0.500 ha | 1.33 | 1.5 |

| Habitat code | Habitat name | Code of the habitat type | Name the habitat type | Area | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
|--------------|--|--------------------------|--|----------|-------------------|-----------------------|
| T3.4D | Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (<i>Juniperus communis</i>) | 6210 | Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnatých podložích (<i>Festuco-Brometalia</i>) (* význačná naleziště vstavačovitých) | 0.213 ha | 0.57 | 4 |
| V4B | Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta | -- | -- | 0.115 ha | 0.3 | 3.81 |

List of species of conservation finding database

| Category | Latin name of the species | Czech name of the species | Protection category (Law 114/92 Sb.) | Directive of birds/habitats | Red list | Invasiveness (i) | Year of last record |
|---------------|--|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Motýli | <i>Phengaris nausithous</i> | modrásek bahenní | Silně ohrožený | HD II, HD IV | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2015 |
| Obojživelníci | <i>Salamandra salamandra</i> | mlok skvrnitý | Silně ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2015 |

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). *Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky*. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.